

Cases fra andre regioner

Bandage/ortose:

afklaringskatalog.rm.dk/skinner-bandager-korsetter-og-baelter-ortoser

En 24-årig fodboldspiller får under kamp, i en hård tackling, et vrid i knæet. Patienten indlægges og gennemgår en kikkert operation, hvor det konstateres, at forreste korsbånd er sprunget og den indvendige menisk er skadet. Meniskskaden sutureres og patienten udstyres med en hængslet knæbandage/orthose i X-uger. Patienten får udleveret et par albuestokke, der skal bruges i en X-ugers periode. Efter X-uger indkaldes patienten til videre udredning/kontrol i forhold til skaden på forreste korsbånd.

Primære formål: Behandling

En 57-årig mand pådrager sig en peroneus parese i forbindelse med en kompliceret hoftealloplastikoperation, som medfører en dropfod. Patienten udstyres med en dropfodskinne og følges i ortopædkirurgisk ambulatorium. Der skal efter X mdr. vurderes, om patienten skal sendes til videre udredning. Patienten udskrives med en række behandlingsredskaber, for ikke at forringe behandlingsresultatet i den mellemliggende X mdr. periode.

Primære formål: Behandling

Hvis tilstanden bliver varig, kan patienten ansøge kommunen om hjælpemidlet efter §112 i Lov om Social Service.

Primære formål: Afhjælpende

Borger der har brug for støttende skinne til håndled for at mindske smerter i håndled og opnå øget udholdenhed. Det er alene til de borgere, som har behov for udførsel af daglige aktiviteter, der udleveres skinner til.

Patienten er indlagt på sygehus eller tilknyttet ambulatorium, hvor patienten behandles for sin lidelse. Afprøvning og vejledning i brug af skinner med forventning om varigt behov sker ved behov i hospitalsregi (feks. ved nydiagnosticeret gigtlidelse.) Skinnerne genbruges ikke.

Primære formål: Behandling

Borger har brug for skinner til udførsel af daglige aktiviteter til varigt brug.

Primære formål: Afhjælpende

Borger har et midlertidigt behov for skinner men modtager ikke behandling på sygehus.

Ansvarlig for finansiering: Egenbetaling

Parenteral ernæring:

afklaringskatalog.rm.dk/parenteral-ernaering

En patient opstartes i parenteral ernæring på sygehuset. Sygehuset vurderer at patienten kan fortsætte den parenterale ernæring i hjemmet, med hjælp fra hjemmeplejen.

Primære formål: Behandling

Visse borgere kan have behov for hjælp til håndtering af den intravenøse ernæring. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har den 30. juni 2005 udtalt, at et sygehus' ordinerings af et apparatur ikke automatisk bevirker en forpligtigelse for sygehuset til at deltage i den fortsatte pleje af patienten i hjemmet. Livslang behandling med parenteral ernæring kan ikke kategoriseres som specialiseret behandling på linje med respiratorbehandling eller hjemmedialyse. Det bemærkes endvidere, at der er 100 % dækning til receptpligtig medicin (inkl. ernæringspræparater), hvis borgeren er terminalerklæret.

Permanente dræn:

afklaringskatalog.rm.dk/permanente-draen

En patient i samordnet pleje, der har brug for indlæggelse til ascitesdrænage - ca. hver 7-14 dag. Kan få anlagt et permanent ascitesdræn på sygehuset, og har derved mulighed for at opholde sig mest muligt i eget hjem den sidste tid. Patienten udskrives med det permanente dræn og ascitesvæsken udtappes i hjemmet af patienten selv, pårørende eller af hjemmesygeplejen, så patienten undgår de hyppige indlæggelser

Stamafdelingen har ansvaret for, at patienten har det fornødne materiale i hjemmet. Leverandør kan være forskellig fra sygehus til sygehus i henhold til sygehusets instrukser.

Primære formål: Behandling

Kateter:

afklaringskatalog.rm.dk/katetre

1.a. Borger henvender sig til egen læge på grund af inkontinens. Egen læge råder borger til at anvende ble. Egen læge henviser til sygehuset m.h.p. udredning og evt. operation.

Ansvarlig for finansiering: Egenbetaling

1.b. Borger henvender sig til egen læge på grund af inkontinens. Egen læge råder borger til at anvende ble. Egen læge henviser ikke til sygehuset m.h.p. udredning og evt. operation.

Ansvarlig for finansiering: Egenbetaling

2. Borger venter tre måneder på forundersøgelse. Ved forundersøgelsen konstateres det, at operation er mulig og borger indstilles til operation, dog forsøges med optræning af bækkenbund inden.

Primære formål: Behandling

3. Borger opereres og er i efterforløbet inkontinent. Lægeligt vurderes det, at borger bliver kontinent indenfor en vis periode. Borger oplæres i selv at foretage katerisation.

Primære formål: Behandling

4. Efter en vis periode konstateres det lægeligt, at borgers mulighed for at blive kontinent ikke er realistisk.

Primære formål: Afhjælpende

Vurderes det allerede ved forundersøgelse, at der ikke er behandlingsmulighed, hjælpes borger til at ansøge kommunen efter § 112 i Lov om Social Service.

Urotainer - skyllevæske til kateter.

Privatpraktiserende læge har sendt følgende ansøgning til kommunen:

Dianose: Kronisk KAD bærer - Stendannelser

Får skiftet KAD 1-2 gange ugentligt, tykkelse skiftet fra 14 til 16 uden ønsket effekt.

Der dannes sten, trævler som stopper katetret.

Derfor anmodes kommunen om at bevilge dette.

Der anbefales anvendelse 2-3 gange ugentligt til en start gående ned til evt. 1 gang ugentligt.

Hjemmesygeplejen kommer og foretager skylningerne.

Primære formål: Afhjælpende

Hvis der i forbindelse med at sygehuset anlægger KAD, fra lægelig side ordineres brug af urotainer vil det være et behandlingsredskab.

Primære formål: Behandling

Hvis hjemmesygeplejen ikke kommer i hjemmet og foretager skylninger:

Ansvarlig for finansiering: Egenbetaling

Urotainer vil aldrig kunne blive bevilget efter § 112 i Serviceloven, idet det er forebyggelse/ behandling.

Transanal irrigation:

afklaringskatalog.rm.dk/transanal-irrigation-og-produkter

Kvinde med dissemineret sklerose. Som følge af lidelsen har patienten svært ved at tømme tarmen med deraf følgende problemer og afføringsinkontinens. Hun er blevet oplært på sygehuset i benyttelse af transanal irrigation med god effekt. Sygehuset ordinerer behandlingsapparatet.

Primære formål: Behandling

Nefrostomikateter:

afklaringskatalog.rm.dk/nefrostomikateter

En 86 årig mand får anlagt nefrostomikatetre i begge sider juni 2011 pga. afklemning fra nyrerne (c. prostata). Han har siden været til kontrol jævnligt (indimellem ugentligt) på sygehuset, til vurdering af, om katetrene kan seponeres igen. Der er på nuværende tidspunkt ingen afklaring om varighed. Borger kommer derudover til fast skift af nefrostomikatetrene ca. hver tredje måned på Sygehuset.

Den kommunale hjemmesygepleje kommer 2-3 gange om ugen til sterilt skift af forbindelse ved indstikssted, der renses, og katetrene fikseres igen med sterilt tætsluttende semipermeabel forbindelse (eks. Drainfix).

Primære formål: Behandling (Hvem leverer sygeplejeprodukterne? Hvorfor er der forskel i beskrivelsen fra Syddanmark – kommunen er nævnt i casens nedenfor)

En 90-årig mand får anlagt permanente nefrostomikatetre i juni 2012 pga. stop fra urinleder til blære (c. prostata). Der er vurderet, at katetrene ikke kan seponeres igen. Borger kommer til fast skift af nefrostomikatetrene ca. hver tredje måned på sygehuset.

Den kommunale hjemmesygepleje kommer 2 gange om ugen til ballontjek og steril skift af forbindelse ved indstikssted, der renses og katetrene fixeres igen med sterilt tætsluttende semipermeabel forbindelse (eks, Drainfix).

Nefrostomikateteret:

Primære formål: Behandling

Steril semipermeabel forbindelse (eks.Drainfix) Sterile handsker Nacl. skylle/renevæske Sterile gazeswabs:

Primære formål: Afhjælpende

Bleer:

afklaringskatalog.rm.dk/bleer

Patienten er midlertidigt inkontinent i forlængelse af modtaget behandling (f.eks. operation) på hospitalet. Der er ikke behov for henvisning til yderligere behandling.

Primære formål: Behandling

Patienten er inkontinent. Dette konstateres ved forundersøgelse eller under indlæggelse. Patienten henvises til yderligere undersøgelse eller behandling for aktuelle inkontinensproblem.

Primære formål: Behandling

Efter endt udredning og behandling for aktuelle inkontinensproblem konstateres, at patientens behov for bleer ikke ændres, men varigt skal afhjælpes med bleer.

Primære formål: Afhjælpende

Respirator:

afklaringskatalog.rm.dk/respirator

Patient med kronisk lungelidelse udskrives fra sygehus. Der ordineres en respirator til hjemmebrug som led i behandlingen. Brugeren er undervist i brugen og der føres løbende kontrol med behandlingen fra sygehusets side.

Primære formål: Behandling

C-PAP:

afklaringskatalog.rm.dk/cpap

En 47-årig mand med diagnosen A.L.S. får i forbindelse med en endags indlæggelse vurderet, at der er behov for et C-PAP apparat. Det kunne også dreje sig om patienter med diagnoserne cystisk fibrose, Sclerose MS og muskelsvind.

Primære formål: Behandling

Ganghjælpemidler:

afklaringskatalog.rm.dk/mobilitet-og-transport/ganghjaelpemidler

En 24-årig fodboldspiller får under kamp, i en hård tackling, et vrid i knæet. Patienten indlægges og gennemgår en kikkert operation, hvor det konstateres, at forreste korsbånd er sprunget og den indvendige menisk er skadet. Meniskskaden sutureres og patienten udstyres med en hængslet knæbandage/orthose i X-uger. Patienten får udleveret et par albuestokke, der skal bruges i en X-ugers periode. Efter X-uger indkaldes patienten til videre udredning/kontrol i forhold til skaden på forreste korsbånd.

Primære formål: Behandling

En 8-årig dreng får stillet diagnosen Calve Perthe. Til perioder med smerter ved gang får drengen udleveret en kørestol og albuestokke.

Calve Perthe medfører ikke en varig nedsat funktionsevne, selvom behov for kørestol og albuestokke kan strække sig over flere år.

Primære formål: Behandling

-
1. Patienten indlægges til planlagt hoftealloplastik. Det aftales under indlæggelse hvilke behandlingsredskaber patienten har behov for. Patienten opereres og udskrives uden genoptræningsplan.
 2. Ved kontrol efter X uger. vurderer lægen, at der er behov for fortsat brug af albuestokke i yderligere X uger.

Primære formål: Behandling

3. Efter X mdr. postoperativt vurderes at patienten har en varig nedsat funktionsevne og dermed behov for varig hjælpemiddel i hht . Serviceloven.

Primære formål: Afhjælpende

Grundet fremskreden slidgigt i hofte (knæ) indstilles patienten af egen læge til hofte- (knæ) alloplastik. Borgeren er ikke kendt i kommunalt og regionalt regi. Patientens hofte (knæ) er så smertepreget, at patienten/borgeren har behov for albuestokke i ventetiden indtil påbegyndt forundersøgelse.

Indtil foretaget forundersøgelse er hverken region eller kommune forpligtiget til at udlåne albuestokken.

Primære formål: Behandling - fra påbegyndt forundersøgelse

En patient udskrives fra skadestue til eget hjem efter en sportsskade. Der er ikke behov for yderligere behandling/kontrol eller efterfølgende genoptræning. Patienten kan benytte albuestokke for at blive mere mobil.

Ansvarlig for finansiering: Egenbetaling

Manuel kørestol:

afklaringskatalog.rm.dk/mobilitet-og-transport/manuel-koerestol

En 8-årig dreng får stillet diagnosen Calve Perthe. Til perioder med smerter ved gang får drengen udleveret en kørestol og albuestokke.

Calve Perthe medfører ikke en varig nedsat funktionsevne, selvom behov for kørestol og albuestokke kan strække sig over flere år.

Primære formål: Behandling

Toiletforhøjer:

afklaringskatalog.rm.dk/toiletforhoejere

Hjælpemidler til borger med hofteartrose - venter på en forundersøgelse, som skal foregå på sygehuset. Borgeren er kendt af hjemmeplejen i kommunen. Borgeren har for år tilbage fået konstateret slidgigt i hofte og har igennem længere tid fået tiltagende smerter. Det volder efterhånden borgeren store problemer at komme op fra toilettet, da det er specielt lavt, og i de sidste dage har borgeren været nødt til at bede sin ægtefælle om en hånd. Borgeren går til egen læge, der straks sender en henvisning til røntgen med henblik på at få udført en hoftealloplastikoperation. Borgeren kontakter kommunen for at låne en toiletforhøjer for igen at blive selvhjulpnen ved toiletbesøg. Ved forundersøgelsen indstilles patient til operation.

Indtil foretaget forundersøgelse er hverken region eller kommune forpligtiget til at udlåne toiletforhøjer.

Primære formål: Behandling - fra påbegyndt forundersøgelse.

Plejeseng:

afklaringskatalog.rm.dk/plejeseng

I forbindelse med en operation må patienten ikke bruge sine mavemuskler. Patienten skal bruge plejeseng for at kunne blive selvhjulpent i forbindelse med forflytninger. Patienten kan klare sig selv uden hjælp af hjemmesygepleje. Patienten kommer til kontrol på sygehuset.

Primære formål: Behandling

Ramper:

afklaringskatalog.rm.dk/doertrinsudlignere-og-loese-koereskinner

En patient er involveret i et trafikuheld, hvor begge ben beskadiges. Benene skal aflastes, og han må ikke støtte i seks uger. Ved udskrivelse udstyres patienten med en kørestol. Patienten har et stort ønske om at låne en rampe for selv at kunne komme ud i den 6 ugers periode uden støtte.

Regionen vurderer, at en rampe ikke er en del af behandlingsforløbet, hvorfor der ikke er hjemmel til at udlevere.

Hvis Patienten ønsker en rampe, må han leje en for perioden. Kommunen har ej heller hjemmel til at udlevere en rampe.

Ansvarlig for finansiering: Egenbetaling

Skal patienten til og fra evt. træning vil kørselsfirmaerne som led i APV have trappekører til brug for transport ud af huset.

Lymfepresmaskine:

afklaringskatalog.rm.dk/lymfepresmaskine-vaskulaer-kompressor

En kvinde opereres for brystkræft, hvor alle lymfeknuder i højre armhule samtidig fjernes. Efter en lang periode konstaterer sygehuset, at kvinden har et kronisk lymfødeme uden at dette skyldes udsæd fra brystkræften. Kvinden går til kontrol på sygehuset, men sygehusbehandlingen er ophørt. Kvinden har fået bevilget en armkompressionsstrømpe, som dog ikke er tilstrækkelig til at holde hævelsen nede. Det vurderes, at kvinden har behov for et kompressionsapparat til at lette den daglige tilværelse, idet generne i dagligdagen både hjemme og på arbejde mindskes og kvinden er i stand til at bøjse armen.

Primære formål: Afhjælpende

En patient lider af kronisk lymfødeme i begge ben. Daglig brug af specialsyede kompressionsstrømper (bevilget via Lov om Social Service § 112) har ikke været tilstrækkeligt til at forebygge gentagne tilfælde af erysipelas. På sygehuset er der foretaget manuel lymfedrænage efterfulgt af behandling med kompressionsapparat. Der er fra sygehuset vurderet et varigt behov for brug af kompressionsapparat i hjemmet, i stedet for gentagende lymfødeme behandlinger. Der planlægges kontrol af behandlingen på sygehuset.

Primære formål: Behandling

Kompressionsstrømper:

afklaringskatalog.rm.dk/kompressionsstroemper-aermer-og-handsker

En borger har varige følger efter blodprop i benet. Praktiserende læge vurderer, at der er behov for kompressionsstrømper.

Ifølge serviceloven: Kompressionsstrømper kan ved svære varige lidelser ydes ved:

- Svære grader af åreknuder (varicer), som ikke svinder ved fornøden behandling.
- Varige følger efter blodpropper i ben eller arme.
- Varig hævelse pga. følger efter strålebehandling
- Kronisk ødem i benene pga. en varig utilstrækkelig funktion af vener eller fraførende lymfekar.

Primære formål: Afhjælpende

Trykaflastende madras:

afklaringskatalog.rm.dk/trykaflastende-madras

Tryksårsforebyggende behandling: Patient er stærkt afkræftet af sin sygdom og mobiliseres kun få timer om dagen ud af sengen. Patienten er underernæret. Patienten udskrives fra sygehus uden genoptræningsplan og uden kontrol for underernæring.

Primære formål: Afhjælpende

Vacuum-pumpe:

afklaringskatalog.rm.dk/vacuum-pumpe

Patient med sår, der har svært ved at hele op.

Patienten er indlagt på sygehus /går til kontrol for såret på sygehus/ får ambulat behandling for sårproblemet på sygehus. Såret skiftes mellem ambulatoriebesøg af hjemmesygeplejerske.

Primære formål: Behandling

Patienten er ikke i behandling /til kontrol for såret på sygehus. Patienten får hjælp af hjemmesygeplejerske til sårskift og kommer evt. hos praktiserende læge.

Primære formål: Afhjælpende

Patienten er ikke i behandling på sygehuset for sit sår og står selv for at skifte såret.

Ansvarlig for finansiering: Egenbetaling

Vægtdyne:

afklaringskatalog.rm.dk/vaegtdyne

Den bør vi nok vente med at sætte ind, til vi har drøftet vægtprodukter med Psykiatrien!

Mand på 45 år med paranoid skizofreni og som følge heraf vrangforestillinger, forfølgelsesforestillinger, social angst, hørehallucinationer. Har problemer med at udføre dagligdags aktiviteter pga. dårligt søvnmønster, der dog er bedre under indlæggelse. Medicinsk behandling har nogen effekt og der vurderes behov for samtaler det næste år for at opretholde den opnåede effekt af behandlingen under indlæggelse. Udskrives til forløb hos speciallæge i psykiatri. Patienten har under indlæggelse afprøvet tyngdedyne, hvilket vurderes at have haft effekt på patientens døgnrytme. Da patientens tilstand fortsat ikke er stabil, udskrives han med tyngdedyne som behandlingsredskab. Der følges op på effekten i det videre forløb i lokalpsykiatrien.

Primære formål: Behandling

Når patientens tilstand vurderes at være stationær og det samtidig vurderes, at tyngdedynen er en forudsætning for, at patienten kan udføre de ønskede daglige aktiviteter, kan tyngdedynen ansøges i kommunen som et hjælpemiddel.

Kvinde på 34 år med diagnosen emotionelt ustabil personlighedsstruktur. Hun er i sin habituelle tilstand og der vurderes ikke at være yderligere behandlingsmuligheder. Borgeren har svært ved at sove og vågner flere gange om natten, grundet motorisk uro, tankemylder og konstant høj arousal. Den nedsatte søvnmængde- og kvalitet påvirker hendes hukommelse, koncentration, og hun udtrættes let mentalt.

Dette medfører, at borgeren har svært ved at:

- påbegynde og dernæst færdiggøre oprydning i hjemmet
- passe sine studier
- have overskud til at træne
- komme i brusebad
- påbegynde og dernæst færdiggøre rengøring
- deltage i større sociale sammenhænge, f.eks. familiesammenkomster

Ved brug af kugledyne på 7 kg om natten, oplever borgeren, at sove hele natten og ligger ligeledes mere roligt ifølge ægtefælle. Det betyder, at hun har mere energi og har ikke behov for hvil i løbet af dagen. Borgeren oplever; at have nemmere ved at komme i bad, nemmere med igangsætning af lektier, nemmere med at komme i gang med oprydning m.m., og udtrættes ikke så hurtigt mentalt. Tyngdedyne vurderes at afhjælpe generne af pt. varige nedsatte funktionsevne og er dermed en væsentlig lettelse i det daglige.

Primære formål: Afhjælpende