




Tidlig opsporing og rettidig reaktion ifm. kritisk åreforkalkning og forøget risiko for amputation

Guideline for triage af sår på underben og fødder

	Observation  Hvis én eller flere af nedenstående fremtræder:	Reaktion Udløses som udgangspunkt følgende handlinger:
	<ul style="list-style-type: none"> • Sår i heling inden for 4 uger • Behov for sårbehandling 1-3 gange pr. uge • Ingen smerteproblematik 	Behandling og observation varetages af kommunalt sundheds-personale
	<ul style="list-style-type: none"> • Sår i mere end 4 uger med tvivlsom heling • Behov for sårbehandling mere end 3 gange pr. uge • Sår med tegn på infektion • Smerter, som dog kan afhjælpes (særlig opmærksomhed på claudicatio og natlige smerter) 	Kommunalt sundhedspersonale opretter borgeren i pleje.net og involverer kommunal sårsygeplejerske med henblik på vurdering og planlægning af videre indsats. Kommunal sygeplejerske kan efter behov opsøge rådgivning/sparring i hospitalsregi forudsat, at borgeren allerede er kendt i hospitalsregi. Borgerens praktiserende læge informeres via korrespondancebrev, herunder mhp. mulighed for vurdering af behov for yderligere udredning, behandling, ændring af behandlingsstrategi etc. (praktiserende læge kan efter behov indhente rådgivning/sparring i hospitalsregi vedr. både nye og kendte patienter i hospitalsregi).
	<ul style="list-style-type: none"> • Alle diabetiske fodsår • Sår, der har varet i mere end 8 uger med tvivlsom heling • Behov for daglig sårbehandling • Smerter, der ikke kan afhjælpes 	Praktiserende læge henviser borgeren til udredning/behandling i hospitalsregi (for borgere, der allerede er i forløb i hospitalsregi, kan den kommunale sygeplejerske kontakte hospitalet/sårcentret direkte mhp. vurdering af behov for håndtering i hospitalsregi).