





Tidlig opsporing og rettidig reaktion ifm. kritisk åreforkalkning og forøget risiko for amputation

Guideline for triage af sår på underben og fødder

Observation  Hvis én eller flere af nedenstående fremtræder:	Reaktion Udløses som udgangspunkt følgende handlinger:
 <ul style="list-style-type: none">• Sår i heling inden for 4 uger• Behov for sårbehandling 1-3 gange pr. uge• Ingen smerteproblematik	Behandling og observation varetages af kommunalt sundhedspersonale
 <ul style="list-style-type: none">• Sår i mere end 4 uger med tvivlsom heling• Behov for sårbehandling mere end 3 gange pr. uge• Sår med tegn på infektion• Smerter, som dog kan afhjælpes (særlig opmærksomhed på claudicatio og natlige smerter)	Kommunalt sundhedspersonale opretter borgeren i pleje.net og involverer kommunal sårsygeplejerske med henblik på vurdering og planlægning af videre indsats. Kommunal sygeplejerske kan efter behov opsøge rådgivning/sparring i hospitalsregi forudsat, at borgeren allerede er kendt i hospitalsregi. Borgerens praktiserende læge informeres via korrespondancebrev, herunder mhp. mulighed for vurdering af behov for yderligere udredning, behandling, ændring af behandlingsstrategi etc. (praktiserende læge kan efter behov indhente rådgivning/sparring i hospitalsregi vedr. både nye og kendte patienter i hospitalsregi).
 <ul style="list-style-type: none">• Alle diabetiske fodsår• Sår, der har varet i mere end 8 uger med tvivlsom heling• Behov for daglig sårbehandling• Smerter, der ikke kan afhjælpes	Praktiserende læge henviser borgeren til udredning/behandling i hospitalsregi (for borgere, der allerede er i forløb i hospitalsregi, kan den kommunale sygeplejerske kontakte hospitalet/sårcentret direkte mhp. vurdering af behov for håndtering i hospitalsregi).